

FLAXATO

Flavoxato Clorhidrato

G04BD02: Antiespasmódico Urinario

FORMA FARMACÉUTICA:

Tabletas.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Flavoxato Clorhidrato.....200mg

Excipientes C.S.P.....1 tableta

DESCRIPCIÓN:

El Flavoxato es un anticolinérgico con efectos antimuscarínicos. Sus propiedades como relajante muscular pueden deberse, más bien, a una acción directa sobre el músculo liso en vez de actuar como antagonista de los receptores muscarínicos. Actúa inhibiendo la fosfodiesterasa dependiendo de AMPc, la cual reduce la eficiencia del sistema de calcio como segundo mensajero durante la contracción del músculo liso.

INDICACIONES:

El Flavoxato se usa para tratar espasmos de la vejiga urinaria. Está indicado para el alivio sintomático de cistitis intersticial, disuria, urgencia, nocturia, dolor suprapúbico, frecuencia e incontinencia cuando puedan ocurrir en la cistitis, prostatitis, uretritis, uretrocistitis, uretrotrigonitis. Como coadyuvante en el tratamiento antiespasmódico de la calculosis renal y uretral, de la espasticidad de las vías urinarias en el cateterismo, citoscopia, y secuelas de intervención quirúrgica sobre las vías urinarias bajas. En el tratamiento de los estados espásticos de las vías genitales femeninas, como dolor pélvico, dismenorrea, hipertonia y disquinesia uterina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

POSOLÓGIA (DOSIS): La dosis recomendada es de 1 tableta 3-4 veces al día a intervalos regulares. Siempre a juicio del facultativo.

PRECAUCIONES:

En los pacientes con infección concomitante de las vías genito-urinarias, debe asociarse un tratamiento antiinfeccioso adecuado. Se utilizará con precaución en los pacientes con glaucoma, especialmente en la forma de ángulo cerrado, y en los pacientes con uropatía obstructiva de las vías urinarias bajas con descompensación grave.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes hipersensibles al producto. Obstrucción pilórica o duodenal, acalasia, lesiones intestinales obstructivas o íleo, hemorragia gastrointestinal. Uropatías obstructivas del tracto urinario bajo. Niños menores de 12 años. Durante los tres primeros meses de embarazo y durante la lactancia.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Raramente se ha presentado náuseas, vómitos (que en general desaparecen si se ingiere el fármaco después de las comidas), sequedad de boca, vértigo, cefalea, somnolencia (que en general disminuye si se reduce la dosis administrada o se amplía el intervalo entre las administraciones), labilidad emotiva, visión borrosa y alteración de la acomodación, hipertensión ocular, urticaria u otras reacciones cutáneas, confusión mental (especialmente en ancianos), disuria, taquicardia, fiebre, eosinofilia y a dosis altas, estreñimiento. Raramente, leucopenia.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA

CONducIR Y UTILIZAR MAQUINARIAS: Se pondrá en conocimiento de los pacientes en tratamiento que deban conducir vehículos, manejar maquinaria peligrosa o realizar trabajos de precisión, la posibilidad de aparición de efectos secundarios como somnolencia, visión borrosa y vértigo.

INTERACCIONES: Debe procederse con cautela cuando se administran conjuntamente estimulantes del sistema nervioso central, así como antidepressivos tricíclicos o inhibidores de la MAO.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS /

INTOXICACIÓN: En caso de ingestión accidental, se procederá a lavado gástrico dentro de las 4 horas que siguen a la toma del medicamento. Si la sobredosificación es extrema o si se retrasa la eliminación del medicamento del estómago debe considerarse la administración de un para simpaticomimético.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C, protegido de la luz y la humedad.

RECOMENDACIONES: Úsese por prescripción médica. Venta bajo receta médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN: Caja con 30 tabletas.

REGISTRO SANITARIO: 2014-1416

FABRICANTE Y TITULAR:

Laboratorios Antillanos Edmar, S. A.
Santo Domingo, República Dominicana
Registro Industrial No. 15267

 **Laaned**
LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S.A.